

Правила поведінки у разі викиду хлору:

- швидко вийти з району впливу хімічно-небезпечної речовини перпендикулярно напрямку вітру;
- використовувати для захисту верхні поверхи будинків;
- провести герметизацію приміщення: щільно закрити вікна, двері, вентиляційні отвори; заклеїти щілини у вікнах і дверях плівкою, скотчем, тканиною, змоченою у розчині харчової соди чи води;
- використовувати протигази всіх типів, респіратори з відповідним фільтром, за їх відсутності – ватно-марлеві пов'язки, змочені водою або 2-5% розчином харчової соди;
- одягнутися так, щоб максимально закрити шкіру та очі (плащ, гумові чоботи, рукавички, захисні окуляри тощо);
- швидко зібрати необхідні речі та підготуватися до евакуації;
- не вживати їжу та воду, які перебували у зоні хімічного ураження;
- слідкувати за офіційними повідомленнями у засобах масової інформації та дотримуватися подальших вказівок від місцевої влади.

За перших ознак ураження хлором:

- постраждалого необхідно негайно вивести на свіже повітря;
- дати випити теплого молока з харчовою содою;
- одягнути ватно-марлеву пов'язку, змочену водою, краще 2% розчином харчової соди;
- змити водою хімічне забруднення з відкритих ділянок тіла, очі, рот, ніс промити 2% розчином харчової соди;
- змінити верхній одяг;
- транспортувати лише у лежачому положенні;
- уникати будь-яких фізичних навантажень;
- забезпечити тепло та спокій, питний режим;
- терміново звернутися до медичного закладу за кваліфікованою допомогою.